

Type de produit  
Type de formulation  
Substance active  
Concentration  
Amérisant

Biocide TP14 – Rodenticide  
Appât sur grain (avoine décortiquée), prêt à l'emploi  
Brodifacoum N° CAS 56073-10-0  
0.005 % m/m  
Benzoate de denatonium 10 ppm

### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom homologué  
N° d'AMM

SAPHIR GRAIN  
FR-2014-0097 – Professionnels de la lutte contre les rongeurs

Organismes ciblés

Rats bruns (*Rattus norvegicus*)  
Rats noirs (*Rattus rattus*)  
Souris domestiques (*Mus musculus*)

Application

Utilisation en intérieur, autour des bâtiments / en zones ouvertes extérieures, directement dans les terriers, décharges et déchetteries (rats uniquement)

### MODE D'ACTION

Le Brodifacoum est un anticoagulant de deuxième génération.  
Les rongeurs meurent d'hémorragies internes quelques jours après ingestion de l'appât.

### CONDITIONS ET DOSES D'EMPLOI

Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage ou des points d'appâts couverts et protégés.

Utilisation en intérieur, autour des bâtiments :

**Contre les rats** : 50 à 100 g de produit espacés d'un minimum de 2 m.

**Contre les souris** : 20 à 30 g de produit espacés d'un minimum de 5m.

Utilisation dans les décharges extérieures et zones ouvertes :

Contre les rats : 50 à 100 g de produit par point d'appât espacés d'un minimum de 5 m ou directement dans les terriers. Couvrir ou bloquer les entrées du terrier où est placé l'appât afin de réduire le risque que l'appât soit ressorti ou dispersé.

Inspecter les portes après 2 à 3 jours (souris) et 5 à 7 jours (rats) pour vérifier que l'appât est accepté, puis une fois par semaine.

Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.

### **NE PAS utiliser en APPÂTAGE PERMANENT**

Usage réservé aux professionnels

N° Tél. 05.49.83.30.30

[www.alliance-elevage.com](http://www.alliance-elevage.com)  
[ap@alliancepastorale.fr](mailto:ap@alliancepastorale.fr)

Code APE : 9411 Z  
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny  
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Raticide Racan Avoine BR  
Mars 2023  
Page 1/2

depuis 1933...

## ÉLIMINATION

Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les cadavres de rongeurs conformément à la réglementation locale. Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant. Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause.

**TP 14** – Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement. Utiliser les rodenticides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit .

La fiche de données sécurité est disponible.

Les postes d'appâtage contenant RACAN AVOINE BR doivent être étiquetés avec les informations suivantes :

Nom du produit :	
<input type="text"/>	
Substance active :	Ne pas déplacer, ni ouvrir.
Difénacoum	<input type="checkbox"/> Contient un rodenticide.
Bromadiolone	<input type="checkbox"/> En cas d'incident, contacter un centre antipoison.
Brodifacoum	<input type="checkbox"/> N°ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59
Autre	
<input type="text"/>	

