

Réf : 0200725

COMPOSITION

Lactosérum en poudre, concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé en poudre, huile de colza, gluten de blé, lactosérum partiellement dé lactosé, huile de coprah, huile de palme, huile de soja, extrait de levure de bière inactive (MOS).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	23	%
Matières grasses brutes	25	%
Cendres brutes	8	%
Humidité	3.5	%
Cellulose brute	0.15	%
Calcium	0.8	%
Phosphore	0.7	%
Sodium	0.6	%

ADDITIFS au kg

➤ Vitamines :

Vitamine A (rétinol) E672	25 000 UI
Vitamines D3 (cholécalférol) E671	2 000 UI
Vitamine E (alpha-tocophérol) E307	120 UI
Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)	15 mg
Vitamine K3	5 mg
Vitamine C	500 mg
Choline (chlorure)	880 mg

➤ Oligo éléments

Cuivre (sulfate pentahydraté) E4	2	mg
Fer (sulfate monohydraté) E1	40	mg
Sélénium (sélénite de sodium) E8	0.20	mg
Sélénium (sélénométhionine CNCMI-3060) 3b8.10	0.20	mg
Zinc (sulfate) E6	76	mg
Manganèse (sulfate monohydraté) E5	74	mg
Iode (iodure de potassium) E2	1	mg

➤ Acides aminés

L-Lysine	6 270 mg
DL-Méthionine	2 000 mg
L-Thréonine	980 mg

➤ Antioxygènes

BHT (E321)	48 ppm
------------	--------

➤ Substances aromatiques

Arôme

➤ Minéraux majeurs

Magnésium 0.1 %

Mélange d'huiles essentielles et d'extraits végétaux : nouvelle supplémentation pour un meilleur démarrage des animaux :

- Réduction des contaminations bactériennes (meilleur équilibre de la flore intestinale)
- Stimulation de l'immunité (augmentation des défenses immunitaires)

PLAN D'ALIMENTATION INDICATIF POUR AGNEAUX ET CHEVREAUX

Agneaux : concentration : 200 g par litre d'eau (= 170 g / litre de buvée)

Chevrettes d'élevage : concentration : 140 à 180 g par litre d'eau selon l'âge et l'état des animaux. A partir de la 6^{ème} semaine, diminuer progressivement la distribution de lait pour permettre aux jeunes animaux de consommer davantage d'aliment concentré et préparer ainsi le sevrage 2 ou 3 semaines plus tard.

Sevrer lorsque les animaux consomment au moins 200 g de concentré par jour.

Chevreaux de boucherie : concentration : 140 à 180 g par litre d'eau selon l'âge et l'état des animaux.

Les indications données ci-après sont des normes moyennes et indicatives qui peuvent varier selon l'état des animaux, les conditions d'élevage.

Semaine N°	Agneaux		Chevrettes d'élevage		Chevreaux de boucherie	
	Nombre repas	Litres /jour	Nombre repas	Litres /jour	Nombre repas	Litre /jour
1	3	1	3	1	3	1
2	2	1.5	2	1.5	2	1.5
3	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2.5	2	2.5
5	2	2	2	2.5		
6	1	1	2	2.5		
7	1	1	2	2.5		
8			2	1.5		
9			1	1		

PREPARATION DE LA BUVÉE

Au seau à tétines ou à la gouttière

- Verser le volume d'eau nécessaire à 45 – 50°C, dans un récipient propre.
- Peser l'aliment avant de le verser dans l'eau tiède.
- Agiter à l'aide d'un fouet pendant 20 à 30 secondes.
- Distribuer.

Nourrisseur automatique

- Prévoir 1 tétine pour 15 à 20 animaux.
- Contrôler tous les jours la concentration de l'aliment dans le bol (45°C).
- Nettoyer quotidiennement à l'eau javellisée le bol, les tuyaux et les tétines.

TECHNIQUES D'ELEVAGE

Séparer les animaux des mères dans les 24 heures suivant la naissance après ingestion suffisante de colostrum.

Procéder ensuite à une transition progressive avec l'aliment d'allaitement les 3 ou 4 jours suivants.

L'alimentation solide (concentrés, paille) et **l'eau** doivent être **mises à disposition dès la 2^{ème} semaine** et viendront rapidement remplacer le lait, si celui-ci est apporté selon le plan.

Le **sevrage aura lieu entre 12 et 25 kg**. Prévoir 1 sac d'Allaitance pour sevrer 2 agneaux.

Renforcer la résistance des animaux par l'apport des vitamines et oligo éléments (Sélénium).

Placer les animaux dans un local tempéré (14° à 18°C) et ventilé, et prévoir un chauffage d'appoint (radiants) pour les premiers jours. Prévoir également une litière sèche et abondante renouvelée quotidiennement.