

SORGHO FOURRAGER BMR
Durée d'exploitation: 6 mois



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



HONEY GRAZE

Un fourrage de qualité en conditions séchantes



Utilisation



- Rendement important
- Excellente tolérance au sec
- Gène BMR : excellente digestibilité
- Fourrage frais en plein été



Retrouvez plus d'informations
sur **LGseeds.fr**





SORGHO FOURRAGER BMR
Durée d'exploitation : 6 mois



HONEY GRAZE

Un fourrage de qualité en conditions séchantes



Inscription : 2006 (Italie)

Type variétal :

Hybride sorgho x Sudan-grass fourrager

Particularité :

Gène BMR (digestibilité améliorée)

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

■ Peu adapté

■ Moyennement adapté

■ Très adapté

Conseils culturaux

■ Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semis à 2 cm de profondeur.
- Ecartement entre les rangs = 12 à 20 cm.
- Dose en pur : de 25 à 30 kg/ha.
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.
- Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir si nécessaire en respectant les précautions d'usage.

■ Exploitation :

- Ne pas pâturer avant 60 à 70 cm de végétation : présence d'acide cyanhydrique pouvant entraîner des risques de toxicité (le fil arrière est donc recommandé).


- Affouragement possible au-delà de ce stade 60 à 70 cm de végétation.
- Foin et ensilage sans aucun risque car ces substances se dégradent en une semaine.
- Le conditionnement après la fauche préserve la qualité du fourrage

■ Caractères agronomiques :

- Plante d'origine tropicale (température optimale de croissance entre 24 et 32°C)
- Excellente tolérance à la sécheresse.
- Meurt dès les premières gelées.
- Gène BMR (Brown Mid Rib) = Diminution de la teneur en lignine + augmentation de la digestibilité.


Performances de la variété

Un rendement imposant associé à une excellente digestibilité



● Teneur en lignine
Essais LG/ASTRIA Drome 2006

Une qualité record pour une rentabilité maximale !



● Rentabilité UFL/ha
Essais LG/ASTRIA Drome 2006

Les points forts

- Très bon rendement pour un type BMR.
- Rendement UFL record comparé aux autres sorghos fourragers.
- Très tolérant au sec.
- Très digestible pour une ration plus efficace.

Nos conseils

- Ne pas pâturer avant 60 - 70 cm.
- Pâturer au fil arrière.
- En fauche, le conditionnement permet de préserver la qualité

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.