



LG HERB'ALLIANCE

Pour du fourrage de qualité toute l'année





LG HERB'ALLIANCE - Compo. 5 ans



Des prairies haut de gamme, saines et productives



- Composition mixte longue durée
- Très bonne rusticité et tolérance au sec grâce au dactyle
- Du fourrage de qualité toute l'année
- Excellente productivité et tolérance à la rouille
- Fourrage équilibré en énergie et protéines (dactyle, luzerne)

Avec **LG HERB'ALLIANCE**, optez pour une composition adaptée à votre terroir pour allier rendement et qualité.




LG HERB'ALLIANCE


La performance au rendez-vous (productivité, appétence, qualité)

Espèce	Variété	Type Variétal	Points Forts
Dactyle	Bolide	½ Tardif	Rendement, 1 ^{ère} variété rdt été, teneur en protéines, souplesse d'exploitation, état sanitaire
Ray-grass anglais	Vauclin	½ Tardif tétraploïde	Très bon rendement, très faible remontaison, souplesse d'exploitation, profil sanitaire, suc
Féruque des prés	Petrarca		Productivité de printemps, adaptation à la fauche, facilité de séchage
Fléole des prés	Comtal		Appétence, qualité du fourrage au printemps
Trèfle blanc	Milagro	Intermédiaire	Productivité, agressivité

Composition :



Peuplement dans la prairie :



Une bonne présence de dactyle pour garantir la qualité et la pérennité.





LG HERB'ALLIANCE

Les clés de la réussite



● Le semis :

- Semer Herb'Alliance fin août ou au début du printemps sur un sol finement préparé et bien rappuyé (sol non hydromorphe)
- Le RGA, rapide d'implantation, occupera rapidement le sol pour limiter le salissement.

● Le déprimage :

- Le déprimage de la parcelle en sortie hiver (pâturage rapide) permet de favoriser le tallage des graminées et le développement du trèfle en leur donnant accès à la lumière.

● Le nettoyage :

- A partir de la 2^e année d'exploitation, un nettoyage de la parcelle avant l'hiver permet de pérenniser la culture et favoriser le redémarrage en sortie d'hiver.

● La fertilisation :

- Dès que la portance sortie hiver le permet, un apport d'azote (minéral ou engrais de ferme) est effectué à 200^e jours (base 1 janvier) pour « réveiller » la culture sans défavoriser la proportion de TB par rapport à la graminée. (environ 40 u)
- Après chaque coupe, il est conseillé de fertiliser la prairie pour compenser les exportations.



LG HERB'ALLIANCE

Exploitation



● Sortie hiver :

- Déprimage

● Début de Printemps :

- **Pâturage** : le dactyle démarre tôt en végétation et pourra être pâturé à partir du 10/04. Le RGA et la fétuque des prés démarreront à leur tour ensuite.
- **Ensilage** : une coupe en ensilage est possible mais idéalement début mai car le dactyle arrivera au stade début épiaison à cette date. Fauche entre 6 et 8 cm.

● Fin de Printemps :

- **Pâturage** : le pâturage peut se poursuivre ou démarrer après la coupe d'ensilage. Attention à respecter des retours à 3 semaines maximum pour favoriser la consommation du dactyle qui est plus appétent à un stade jeune.
- **Ensilage** : un ensilage est possible fin mai si le dactyle a bien été pâturé plus tôt. L'enrubannage et le foin sont également des solutions.

● Eté :

- Le dactyle permet une pousse estivale qu'il est possible de valoriser en fauche ou au pâturage. L'alternance de la fauche et la pâture permet de préserver l'équilibre des plantes pour ne pas favoriser une espèce au détriment d'une autre

● Automne :

- Les repousses d'automne sont de très bonne qualité nutritionnelle. L'exploitation mixte reste possible à cette période.



LG Semences Hybrides et Fourragères

Biopôle Clermont-Limagne - Rue Henri Mondor - 63360 Saint-Beauzire

Tél.: +33 (0)4 15 40 03 00

www.LGseeds.fr

