



HD11508

LERADES MSC REGULAR

Réf. 1002123

Date de mise à jour : 14/08/2025

Version FT : 1.0

Détergent désinfectant alcalin chloré

Produit biocide en cours d'évaluation selon le Règlement UE n° 528/2012 **Inventaire BioCID**
: 85716

LERADES® MSC REGULAR nettoie et désinfecte les installations de traite, tank de stockage, matériels de production laitière et fabrication à la ferme. Elimine les souillures grasses, organiques, protéines grâce à son mélange riche en soude, potasse, chlore et agents séquestrants. Désinfectant à large spectre BACTERICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE, SPORICIDE, BACTERIOPHAGE, VIRUCIDE, MYCOBACTERICIDE. S'utilise en alternance avec un acide.



UTILISATIONS

Prélever le matériel à l'eau tiède et potable.

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un prélavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'utilisation	Application	Température d'utilisation	Dosage	Temps de contact
Machine à traire, production du lait	Circulation	40 à 70°C	0,5 à 2,5%	5 à 15 min

Rincer abondamment avec de l'eau potable les circuits et surfaces traités ainsi que les matériels d'application.

COMPLÉMENT D'INFORMATION :

Utiliser à une température stabilisée de 35°C minimum en fin de cycle (50°C pour les brebis).

MATÉRIEL D'APPLICATION : STOCKMEIER vous propose un large catalogue réunissant toute une gamme de matériel dédié à l'application et au stockage de nos produits, rétention, soutirage, transfert, dosage, moussage, pulvérisation...

Demander un catalogue à votre technico-commercial ou écrivez-nous à baso@stockmeier.fr.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Limpide
Couleur	Légèrement jaune
Odeur	Chlore.
Matière(s) active(s)	Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9) à 3,8% (% m/m) de Cl actif
Densité	1,15 ± 0,02 (20°C). Ne peut être retenu comme unique critère de contrôle.
pH pur	> 13 (20°C)
pH à 1% dans l'eau distillée	13 ± 0,2 (20°C)
Viscosité, dynamique	< 10 mPa·s (20°C)
Pouvoir séquestrant à 1%	30 ° TH (20°C); sol. 1%
Tension superficielle [N/m]	55 N/m (20°C); sol. 1%
DCO-valeur	2,3 mg O2/g (20°C)
Teneur en azote	0 %

Teneur en phosphore	0,104 %
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température de stockage	0 – 25 °C
DDM (date durabilité minimum)	9 mois, voir conditionnement.

RÉGLEMENTATION

Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE n° 2018/848 et ses amendements.
Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant celui du 08/09/99 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires et eaux de boisson.

PROPRIETES BIOCIDES

Produit biocide en cours d'évaluation selon le Règlement UE n° 528/2012
Inventaire BioCID : 85716

MATIÈRE(S) ACTIVE(S) : Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9) à 3,8% (% m/m) de Cl actif

Règlement Biocide 528/2012 UE. Type de produit (TP) n°

- 4 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

BACTERICIDIE - 1 % TP2, TP4

EN1276 - 1 min - 60°C - saleté. 10 g/l de lait écrémé - industrie du lait

Souches testées : *Enterococcus faecium*.

LEVURICIDIE - 1 % TP2, TP4

EN1650 - 1 min - 60°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 10 g/l de lait écrémé - Industries du lait

Souches testées : *Candida albicans*.

FONGICIDIE - 2,5 % TP2, TP4

EN1650 - 1 Min - 60°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 10 g/l de lait écrémé - industrie du lait

Souches testées : *Aspergillus brasiliensis*.

VIRUCIDIE PHAGE - 1 % TP2, TP4

EN13610 - 5 min - 40°C - saleté. 10 g/l petit-lait acide - conditions de saleté générales, 10 g/l de lait écrémé - industrie du lait

Souches testées : *Bacteriophage P001*, *Bacteriophage P008*.

VIRUCIDIE - 1 % TP2, TP4

EN14476 - 15 min - 20°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 3 g/l d'albumine bovine + 3 ml d'érythrocytes de mouton - industrie de la viande

Souches testées : *Adenovirus type 5*, *Poliovirus type 1*, *Norovirus murin*.

VIRUCIDIE - 0,5 % TP2, TP4

EN14476 - 5 min - 50°C, EN14476 - 1 min - 60°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 3 g/l d'albumine bovine + 3 ml d'érythrocytes de mouton - industrie de la viande

Souches testées : *Parvovirus murin*.

SPORICIDIE - 6 % TP2, TP4

EN13704 - 15 min - 50°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 10 g/l de lait écrémé - industrie du lait

Souches testées : *Bacillus subtilis*, *Clostridium sporogenes*.

MYCOBACTERICIDIE - 6 % TP2, TP4

EN14348 - 15 min - 20°C, EN14563 - 15 min - 20°C - saleté. 3 g/l d'albumine bovine - conditions de saleté générales, 3 g/l d'albumine bovine + 3 ml d'érythrocytes de mouton - industrie de la viande

Souches testées : *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium Terrae*.

CONDITIONNEMENTS

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

CONSIGNES DE SECURITE

Recommandations d'utilisation : Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. Eliminer le produit non utilisé et son emballage et tout autre déchet dans les circuits de collecte appropriés. Ne pas se débarrasser du produit dans les canalisations ou dans l'environnement extérieur (sols, cours d'eau, etc...). Informer le détenteur de l'autorisation en cas d'inefficacité d'un traitement.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des : Acides. Craint le gel.

Température de stockage : 0 – 25 °C

Ce produit est compatible avec les inox, PVC, Polyéthylène, Polypropylène, verre, caoutchouc.

CONTROLE DE CONCENTRATION

Prise d'échantillon : 10 ml

Neutraliser le chlore avec du thiosulfate de sodium

Indicateur coloré : Phénolphthaléine (indicateur TA)

Doser jusqu'à zone de virage avec : HCL N/5 puis noter le volume "V"

Résultat du test de concentration en % = Volume "V" x 1,052

TRAITEMENTS DES DECHETS

Traitement des déchets : Se reporter au chapitre 13 de la FDS.

Motif de la mise à jour : Création

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

Les valeurs physicochimiques caractéristiques mentionnées sur cette fiche, hors chapitre spécifications de vente Stockmeier France, sont indicatives et non garanties, les spécifications et résultats des tests étant par ailleurs disponibles sur le certificat d'analyse. Le cas échéant, les concentrations indiquées au point "Propriétés biocides" représentent les concentrations biocides recommandées selon les tests d'efficacité réalisés par des laboratoires agréés. Ces dernières peuvent être adaptées selon les cas d'application. Votre commercial STOCKMEIER France se tient à votre disposition pour aborder ce sujet.

Les déclarations de ce document proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Elles ne dédouanent pas l'utilisateur de procéder à ses propres contrôles et sont rédigées sur la base de nos connaissances à la date de rédaction. Il appartient à l'acheteur et à l'utilisateur final le cas échéant, de s'assurer seuls et en dernier lieu de l'adéquation du produit au regard de l'usage prévu par leur secteur d'activité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent.